

Рекомендации по модификации доз Эральфона®:

Дозы и их модификация	Режим введения			
	Эральфон® 10 000 МЕ	Эральфон® 12 000 МЕ	Эральфон® 20 000 МЕ	Эральфон® 40 000 МЕ
Изначальный режим	150 МЕ/кг 3 раза в неделю, подкожно	150 МЕ/кг 3 раза в неделю, подкожно. Предпочтительнее использовать у пациентов с массой тела от 75 до 85 кг.	20 000 МЕ 2-3 раза в неделю	40 000 МЕ 1 раз в неделю
Увеличение дозы	До 300 МЕ/кг 3 раза в неделю. В случае отсутствия прироста гемоглобина или снижения потребности в трансфузиях через 8 недель		До 60 000 МЕ еженедельно. В случае отсутствия прироста гемоглобина >1 г/дл в течение 4 недель на фоне отсутствия трансфузий.	До 60 000 МЕ еженедельно. В случае отсутствия прироста гемоглобина >1 г/дл в течение 4 недель на фоне отсутствия трансфузий.
Редукция дозы	На 25% В случае приближения уровня гемоглобина к 12 г/дл или увеличения уровня гемоглобина более чем на 1 г/дл за 2 недели.			
Задержка дозы	Если гемоглобин превысил уровень 12 г/дл – воздержаться от введения Эральфона® до снижения уровня < 11 г/дл, затем продолжить введение Эральфона® с редукцией дозы на 25%.			