

# ОСТРЫЙ СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГИТ АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ<sup>1</sup>

Пульмикорт®  
Суспензия  
будесонида



## 1-я степень стеноза гортани

**СРОЧНО!!!**

Ингаляция: **микронизированная суспензия будесонида** — 1 мг

Через 15-20 минут — контроль ЧД, ЧСС\*

Улучшение

Продолжить лечение амбулаторно

Эффект отсутствует

- ▶ Вызов скорой помощи
- ▶ В/м
  - дексаметазон 0,15-0,6 мг/кг или
  - преднизолон 2-5 мг/кг

Эффект отсутствует

Повторить ингаляцию:  
**Будесонид суспензия** — 1 мг

Улучшение

Продолжить лечение амбулаторно

## 2 - 3-я степень стеноза гортани

**СРОЧНО!!!**

Вызов скорой помощи

- ▶ В/м
  - дексаметазон 0,6 мг/кг или
  - преднизолон 2-5 мг/кг

**СРОЧНО!!!**

Ингаляция: **микронизированная Будесонид суспензия** — 2 мг

Через 15-20 минут — контроль ЧД, ЧСС\*

Эффект отсутствует

\* ЧД — частота дыхания, ЧСС — частота сердечных сокращений, В/м — внутримышечно.

