

**ЛЕЧИТЬ.
КОНТРОЛИРОВАТЬ.
ДЫШАТЬ.**



Пульмикорт®
Суспензия
ингаляционная



ПУЛЬМИКОРТ® суспензия: режим дозирования у детей с 6 месяцев до 6 лет

На основании Консенсуса совета экспертов
Педиатрического респираторного общества 2018 г.¹

Базисная терапия БА*

Тяжесть БА	Разовая доза	Кратность приема	Длительность приема
Легкая	0,25 мг	1-2 раза в день	Не менее 2-3-х мес. При достижении контроля через 1-2 мес. возможно снижение дозы до 0,25 мг 1 р/сутки
Средне-тяжелая и тяжелая	0,5 мг	1-2 раза в день	4-6 мес. при среднетяжелой БА, 6-8 мес. и более при тяжелой БА. При достижении контроля через 1-3 месяца необходим пересмотр терапии до 0,5 мг 1 раз в сутки

Терапия обострений БА

Тяжесть обострений	Разовая доза	Кратность приема	Длительность приема
Легкая	0,5 мг	2 раза в день	5-7 дней, далее уменьшение дозы на 50% до разрешения симптомов
Средней тяжести	0,5 мг	2 раза в день	В первый день 2 ингаляции с интервалом 1 час. В последующие дни ингаляции через 6-8 ч. до разрешения симптомов
Тяжелое	1 мг	2 раза в день	До разрешения симптомов

В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена²

Острый стенозирующий ларингит¹⁻³

Тяжесть	Суточная доза	Кратность приема	Длительность приема
1-я степень стеноза	1 мг	1-2 раза в день*	1-2 дня. Постепенного снижения дозы не требуется.
2-3 степень стеноза	2 мг	в 1 или в 2 приема**	2-5 дней. Постепенного снижения дозы не требуется.

* 1 мг однократно, при необходимости повторить ингаляцию в течение суток.

** 2 мг однократно или 1 мг дважды в сутки.

* БА — бронхиальная астма

При обострении любой ст. тяжести — КДБА по потребности или в комбинации с ипратропия бромидом, при тяжелом обострении — при необходимости системные ГКС (дексаметазон, преднизолон)

