

ИНФЕКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ



РИНОФЛУИМУЦИЛ®

Ацетилцистеин, туаминогептана сульфат



РУП N 012943/01 от 11.07.2007

ЕДИНСТВЕННЫЙ*
ТОПИЧЕСКИЙ МУКОЛИТИК
С СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ
КОМПОНЕНТОМ¹

РАСТВОРИЯТ И ВЫВОДИТ СЛИЗЬ
ИЗ ПОЛОСТИ НОСА И ПАЗУХ²

СНИМАЕТ ОТЕК СЛИЗИСТОЙ
ПОЛОСТИ НОСА²

ПРЕПАРАТ ВЫБОРА НА ВСЕХ
СТАДИЯХ ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ
ЛЮБОЙ ЭТИОЛОГИИ⁴

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ²

- Острый и подострый ринит с густым слизисто-гнойным секретом
- Хронический ринит
- Вазомоторный ринит
- Синусит

ФОРМА ВЫПУСКА:
НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ,
10 МЛ

Взрослым по 2 дозы спрея
в каждый носовой ход 3-4 раза в день²

Детям с 6 лет
по 1 дозе спрея в каждый
носовой ход 3-4 раза в день²

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ И ИНЪЕКЦИЙ

МУКОЛИТИК И АНТИБИОТИК

- ➔ ПРЯМОЕ
МУКОЛИТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ
- ➔ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- синусит
- экссудативный средний отит
- ларинготрахеит
- острый и хронический бронхит
- затяжная пневмония
- муковисцидоз
- бронхоэктатическая болезнь

В небулайзере
с распределительным
клапаном
(компрессионном)

Взрослым – по 250 мг

Детям – по 125 мг

1-2 раза в сутки

ФЛУИМУЦИЛ® – АНТИБИОТИК ИТ

N-ацетилцистеин + тиамфеникол¹⁸

ФОРМА ВЫПУСКА:
ЛИОФИЛИЗАТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАСТВОРА ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ И ИНГАЛЯЦИЙ



Ру №12977/01 от 10.06.2008

ФЛУИМУЦИЛ®

100 мг/мл №5

N-ацетилцистеин

ФОРМА ВЫПУСКА:
РАСТВОР
ДЛЯ ИНЬЕКЦИЙ
И ИНГАЛЯЦИЙ

ФЛУИМУЦИЛ®
100 мг/мл

Ацетилцистеин
Раствор для инъекций
и ингаляций

5 ампул по 3 мл
Стерильно
для в/в, в/м,
местного применения



РУ.П.№012974/01 от 17.08.2007

- ➔ Обладает прямым муколитическим действием⁷
- ➔ Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях⁷
- ➔ Активен в отношении всех типов бронхиального секрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)⁸
- ➔ Оказывает антиоксидантное, цитопротекторное и фибринолитическое действие

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Острые заболевания:

острый бронхит, трахеит, ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь

Хронические болезни: хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких, ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой), средний отит, острый и хронический синусит

Ингаляции

В ультразвуковых небулайзерах – 1 ампула 1-2 раза в сутки

В небулайзере с распределительным клапаном (компрессионном) –
1 ампула 1-2 раза в день

Инъекции

В/в или в/м, разбавив 0,9% раствором NaCl, капельно или медленно струйно в течение 5 минут

Детям от 6 до 14 лет ½ ампулы 1-2 раза в сутки

Взрослым по 1 ампуле 1-2 раза в сутки

- ➔ Обладает прямым муколитическим действием¹⁰
- ➔ Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях¹⁰
- ➔ Активен в отношении всех типов бронхиального сокрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)¹⁰
- ➔ Оказывает антиоксидантное и цитопротекторное действие¹⁰
- ➔ Не содержит сахара¹⁰

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ⁸

Пациенты с затруднением отхождения мокроты:

острые заболевания –
трахеобронхит, бронхит, пневмония

хронические болезни –
хронический бронхит, эмфизема, бронхоспастическая болезнь, бронхиальная астма

острый и хронический риносинусит, отит

Взрослым 1 таблетку в день, растворив в 1/3 стакана воды

При острых заболеваниях продолжительность курса 5-10 дней
При хронических заболеваниях – по рекомендации врача¹⁰

ФЛУИМУЦИЛ®

600 МГ №10 и №20

N-ацетилцистеин

**ФОРМА ВЫПУСКА:
ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ**



ФЛУИМУЦИЛ®

200 мг №20

N-ацетилцистеин

ФОРМА ВЫПУСКА:
ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПРИЕМА
ВНУТРЬ

ГРАНУЛЫ
1 ПАКЕТИКА
РАСТВОРИТЬ
В 1/3 СТАКАНА
ВОДЫ



- Обладает прямым муколитическим действием¹¹
- Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях¹¹
- Активен в отношении всех типов бронхиального секрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)¹¹
- Оказывает антиоксидантное и цитопротекторное действие¹¹
- Не содержит сахара¹¹

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ⁸

Пациенты с затруднением отхождения мокроты:

острые заболевания –
трахеобронхит, бронхит,
пневмония

хронические болезни –
хронический бронхит, эмфизема,
бронхэкстазическая болезнь,
бронхиальная астма

острый и хронический
риносинусит, отит

Детям от 2 до 6 лет – по 200 мг
2 раза в день

Детям старше 6 лет и взрослым
по 200 мг 2-3 раза в день

При острых заболеваниях
продолжительность курса 5-10 дней
При хронических заболеваниях –
по рекомендации врача¹¹

Ру № 012975/02 от 14.09.2007

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТОВ¹⁵

- » С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
- » ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ
- » ПРОТИВОЗУДНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ¹⁵

- Острый и хронический наружный отит
- Средний острый отит на стадии до перфорации
- Хронический экссудативный средний отит

Взрослым по 4-5 капель 2-4 раза/сут.

Детям по 2-3 капли 3-4 раза/сут.

в зависимости от тяжести заболевания

**КУРС ЛЕЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕВЫШАТЬ 7 ДНЕЙ**

РУ № N012942/01 от 14.09.2007



АНАУРАН®

АНАУРЕТТЕ[®]



ФИТОСКВАЛАН | МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО | МЯТНОЕ МАСЛО

СПРЕЙ

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРНЫХ ПРОБОК¹³

Фитосквалан

(Phytosqualan®) — экстракт оливкового масла, растворяет ушную серу

Минеральное масло

смывает растворённую серу

Мятое масло

нагревает наружный слуховой проход, ускоряет процесс растворения, обеспечивает приятный запах спрея

ФАКТОРЫ РИСКА ОБРАЗОВАНИЯ СЕРНЫХ ПРОБОК¹⁴

- слуховые аппараты
- телефонные гарнитуры
- пребывание в запыленных местах или зонах повышенной влажности
- занятие водными видами спорта и отдыха

Для взрослых
и детей старше 3 месяцев

РЗН 2013/992 от 07.08.2013

Назаваль® используется для профилактики и в комплексной терапии аллергического ринита¹⁶

Назаваль® действует как естественный барьер по отношению к аэроаллергенам, препятствуя развитию аллергии¹⁶

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ¹⁶

Применяется при аллергическом рините для защиты слизистой носа от аэроаллергенов и поллютантов, а также других агрессивных факторов внешней среды, вдыхаемых с воздухом.

Взрослые и дети

1. Профилактика АР:
при аллергии на пыльцу растений (сезонная аллергия) – начать использовать Назаваль® заблаговременно, за 1–2 недели до предполагаемого начала сезона пыления. При круглогодичном рините (аллергии на домашнюю пыль, животных и др.) можно использовать ситуационно за 5–10 минут до предполагаемого контакта с аллергеном.

2. Комплексная терапия АР:

по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов).

Назаваль® может применяться у детей и взрослых, а также у женщин в период беременности и кормления грудью.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗАВАЛЬ® МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТАК ЧАСТО, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО.

Назаваль

Микронизированная целлюлоза
растительного происхождения

ФОРМА ВЫПУСКА:
**СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ,
ДОЗИРОВАННЫЙ,
500 МГ**



Назаваль ПЛЮС

Микронизированная целлюлоза
растительного происхождения,
экстракт дикого чеснока

ФОРМА ВЫПУСКА:
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ
ДОЗИРОВАННЫЙ,
500 МГ



Ру N ФСЗ 2009/0-4743 от 28.03.2018

Назаваль® ПЛЮС

- действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для защиты от проникновения вирусов и бактерий, попадающих в верхние дыхательные пути при вдохании воздуха¹⁷
- является профилактическим средством от ОРВИ (в том числе гриппа) и других простудных заболеваний¹⁷



ЭКСТРАКТ ДИКОГО ЧЕСНОКА
ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БАКТЕРИЙ
И ВИРУСОВ, ПОПАДАЮЩИХ
НА СЛИЗИСТУЮ НОСА
С ВДЫХАЕМЫМ ВОЗДУХОМ,
И НЕЙТРАЛИЗУЕТ ИХ.

КАК ПРИМЕНЯТЬ

1. Однократно (перед посещением многолюдных мест).
2. Ежедневно – для защиты в период эпидемии.

**НЕВИДИМАЯ МАСКА.
ЗАЩИЩАЕТ
СЛИЗИСТУЮ НОСА**

Назаваль® ПЛЮС
может применяться
у детей и взрослых,
а также у женщин
в период беременности
и кормления грудью.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗАВАЛЬ®
ПЛЮС МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН
ТАК ЧАСТО, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО.

®

Монурал[®]

фосфомицин

ФОРМА ВЫПУСКА:
ГРАНУЛЫ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАСТВОРА ДЛЯ
ПРИЕМА ВНУТРЬ
3 г №1, 3 г №2, 2 г №1



РУ - П № 012976/01

Фосфомицин – первая линия терапии инфекций нижних мочевых путей

УРОВЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 1А¹⁹

- Самый высокий уровень чувствительности возбудителей ИМП²⁰
- Клиническая эффективность и безопасность препарата доказаны за **более чем 40 лет применения в разных странах мира**²⁰
- Курс лечения, состоящий из одной дозы препарата, обеспечивает 100% комплаентность²⁰
- Не имеет клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами²⁰

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- острый бактериальный цистит, острые приступы рецидивирующего бактериального цистита
- бактериальный неспецифический уретрит
- бессимптомная массивная бактериурия у беременных
- послеоперационные инфекции мочевыводящих путей

Внутрь.

Острый цистит: 3 г однократно

Рецидивирующий цистит: 2 раза по 3 г с интервалом 24 часа

С целью профилактики инфицирования мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве, трансуретральных диагностических процедурах

Монурал[®] принимают 2 раза по 3 г: за 3 часа до вмешательства и через 24 часа после вмешательства.

Способ применения

Гранулы растворяют в 1/2 стакана воды (50-75 мл) или другого напитка, перемешивают до полного растворения. Принимают сразу же после растворения.

Ссылки

- * Ринофлуимуцил — единственный назальный спрей имеющий в своем составе ацетилцистеин по данным государственного регистра лекарственных средств, 01.2021.
- 1. Государственный регистр лекарственных средств, 01.2021.
- 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Ринофлуимуцил.
- 3. Cogo A. et al. Efficacy of topical tuaminoheptane combined with N-acetylcysteine in reducing nasal resistance. A double-blind rhinomanometric study versus xylometazoline and placebo. Arzneimittelforschung. 1996 Apr; 46 (4):385-8.
- 4. Клинические рекомендации: острый синусит. Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, 2016.
- 5. Brocard H, Charpin J, Germouth J. Multicenter, double-blind study of oral acetylcysteine vs. placebo. Eur J Respir Dis Suppl. 1980; 111:65-9.
- 6. Справочник поликлинического врача, 2008, №6, с 23-24.
- 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил.
- 8. Княжеская и соавт. N-ацетилцистеин (Флуимуцил) в терапии острых и хронических заболеваний органов дыхания. Справочник поликлинического врача. 2012. - N 4.- С. 56-60.
- 9. Дронов И.А. Новая форма N-ацетилцистеина для педиатрической практики: взгляд клинического фармаколога. Consilium Medicum. Педиатрия. (Прил.) 2013; 01: 76-7.
- 10. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 600 мг.
- 11. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 200 мг.
- 12. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 20 мг/мл.
- 13. Инструкция по применению медицинского изделия Анауретте.
- 14. Свистушкин В.М. Мустафаев Д.М. Современные возможности лечения и профилактики заболеваний наружного уха. РМЖ, 2013, т. 21, N11, стр. 560-63.
- 15. Инструкция по медицинскому применению препарата Анауран.
- 16. Инструкция по применению медицинского изделия Назаваль.
- 17. Инструкция по применению медицинского изделия Назаваль Плюс.
- 18. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил-антибиотик.
- 19. Щистит. Клинические рекомендации. МЗРФ.
- 20. Zhanel G.G. et al.; Can J Infect Dis Med Microbiol 2016; 2016: 2082693
- 21. ИНСТРУКЦИЯ (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Монурал.

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ООО «Замбон Фарма»
Россия, 121002, Москва,
Глазовский пер., д. 7
Тел.: (495) 933-38-30/32



ZAM2103100909