




Простуда. Вирусы. Сезон.

**Помни про Эргоферон!**



**ЭРГОФЕРОН®**

противовирусный препарат для взрослых и детей с 6 месяцев



**76%**

пациентов без вирусных антигенов уже к 3-4 дню лечения<sup>1</sup>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# ЭРГОФЕРОН®: 4 ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРВИ

1. Противовирусное
2. Противовоспалительное

3. Антигистаминное
4. Иммуномодулирующее

## ЭРГОФЕРОН® СОДЕРЖИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ АФФИННО ОЧИЩЕННЫЕ АНТИТЕЛА К<sup>2</sup>

ИФН гамма



запускают каскад реакций противовирусного иммунитета

CD4



мощно включают клеточный противовирусный иммунный ответ

гистамину




оказывают выраженное противовоспалительное действие


## КОМПОНЕНТЫ ПРЕПАРАТА ЭРГОФЕРОН® УСИЛИВАЮТ ПРОТИВОВИРУСНУЮ АКТИВНОСТЬ<sup>3</sup> ДРУГ ДРУГА



Распознавание и элиминация вирусов



Активация и поддержка иммунитета для оптимального ответа на вирусную инфекцию



Уменьшение отека слизистой оболочки дыхательных путей и выраженности сопутствующих инфекционному процессу аллергических реакций

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# ЭРГОФЕРОН® ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ. ПРОТИВ ПРИЧИНЫ И СИМПТОМОВ!<sup>2,3</sup>

Результаты двойного слепого плацебо-контролируемого РКИ<sup>4</sup> при ОРВИ/гриппе




**4,3** Продолжительность катарального синдрома **суток**  
n=282 (возраст - от 6 мес.)

**2,8** Продолжительность лихорадки **суток**

## Результаты наблюдательной программы ЭРМИТАЖ<sup>5</sup>


Средняя продолжительность ОРВИ/гриппа в зависимости от дня начала терапии



Клинический результат лечения Эргофероном не зависит от сроков начала терапии

## ЭРГОФЕРОН® ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ ПАЦИЕНТАМИ И ИМЕЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ<sup>6</sup>

Эргоферон® vs. плацебо:  
результаты оценки безопасности терапии ОРВИ/гриппа



Результаты метаанализа

Нежелательные явления включали также ухудшения и осложнения ОРВИ, потребовавшие назначения антибактериальной терапии и госпитализации

# ЭРГОФЕРОН®: СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА



**Торговое название** Эргоферон®

**РУ:** ЛП-Н (000031) – (РГ-РУ)

**Лекарственная форма**

Таблетки для рассасывания.

**Состав**

Действующие вещества: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 10 000 ЕМД\*, антитела к гистамину аффинно очищенные – 10 000 ЕМД\*, антитела к CD4 аффинно очищенные – 10 000 ЕМД\*.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

\* ЕМД – единицы модифицирующего действия.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противовирусное и иммуностимулирующее средство.

Код АТХ: L03AX.

**Показания к применению**

Эргоферон® показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев. Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Лечение острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, наследственная непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский возраст до 6 месяцев.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Безопасность применения препарата Эргоферон® у беременных не изучалась.

При беременности и в период лактации препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Соотношение «польза-риск» определяется лечащим врачом.

**Способ применения и дозы.**

Риска не предназначена для деления таблетки на части.

Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку следует держать во рту, не проглатывая, до полного растворения.

При назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры. Взрослым и детям с 6 месяцев. В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.

**Побочное действие**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Особые указания**

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности.

**Условия отпуска**

Без рецепта. Полный текст см. в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

## ЭРГОФЕРОН® – ЭТО ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОРВИ У ДЕТЕЙ С 6 МЕСЯЦЕВ



1. Заплатников А.Л., Кондюрина Е.Г., Елкина Т.Н., Бурцева Е.И., Грибанова О.А., Пирожкова Н.И. с соавт. Многоплановая оценка схем терапии острых респираторных инфекций в условиях рутинной педиатрической практики. Антибиотики и химиотерапия. 2016; 61(5-6): 8-20.

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эргоферон®. gfrs.ru

3. При ОРВИ и ОКВИ

4. Geppе N.A., Blokhin B.M., Shamsheva O.V., Abdrakhmanova S.T., Alikhanova K.A., Myrzabekova G.T. Efficacy and Safety of Ergoferon in Children from 6 Months to 6 Years Old with Acute Respiratory Viral Infections in Contemporary Outpatient Practice: A Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Trial. Can Respir J. 2021 Nov 15; 2021: 5570178. doi: 10.1155/2021/5570178.

5. Geppе N.A., Валиева С.Т., Фараджева Н.А., Оганян М.Р., Myrzabekova G.T., Жанузаков М.А. с соавт. Лечение ОРВИ и гриппа в амбулаторно-поликлинической практике: результаты международной наблюдательной неинтервенционной программы «ЭРМИТАЖ». Терапия. 2017; 8(18): 63-78.

6. Горелов А.В., Geppе N.A., Блохин Б.М., Зайцев А.А., Усенко Д.В., Николаева С.В. с соавт. Влияние иммуномодулирующей терапии на течение острых респираторных инфекций вирусной этиологии: метаанализ клинических исследований эффективности и безопасности препарата Эргоферон® в лечении гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Вопросы практической педиатрии. 2021; 16(4): 83–97. doi:10.20953/1817-7646-2021-4-83-97.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ