



RX

N-ацетилцистеин

Раствор для в/в инъекций и ингаляций

В/в, ингаляционно, эндобронхиально, инстилляци

Показания к применению

Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием вязкой трудноотделяемой мокроты: острый и хронический бронхит, трахеит, ларинготрахеит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, бронхолит, муковисцидоз. Внутривенная терапия предназначена для применения у пациентов в отделениях интенсивной терапии и только при невозможности введения препарата внутрь. В качестве антидота при передозировке парацетамолом¹.

Способ применения и дозы

Ингаляционно.

Распыляют по одной ампуле при каждой ингаляции 1-2 раза в день в течение 5-10 дней. Продолжительность ингаляции – 15-20 мин.

Эндобронхиальные инстилляци.

Используют в соответствии с выбранным способом применения (дренаж, бронхоскоп и т.д.) по 1 ампуле 1-2 раза в день или по мере необходимости.

Инстилляци или эндоаурикулярное промывание и промывание других полостей. Средняя дозировка составляет ½ – 1 ампула на процедуру.

Преимущества

Оригинальный муколитик-антиоксидант для в/в инъекций, ингаляций, инстилляций с плейотропными свойствами¹:

- прямым муколитическим;
- противовоспалительным;
- антиоксидантным;
- детоксикационным;
- препятствует адгезии бактериальной флоры к слизистым верхних и нижних дыхательных путей;
- разрушает бактериальные пленки.

Входит в Клинические рекомендации

Острый синусит⁸
Хронический бронхит¹¹
Острый бронхит у взрослых¹³
Внебольничная пневмония у взрослых¹⁴

Идиопатический легочный фиброз¹⁷
Острый средний отит²⁰
Грипп у взрослых¹⁶
Муковисцидоз¹⁸

ОРВИ у взрослых¹⁹
COVID-19¹⁵
ХОБЛ¹²



RX

Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат

Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций

Внутримышечно, для ингаляций, инстилляций, промывания полостей²

Показания к применению

Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов: синусит, ларинготрахеит, экссудативный средний отит.

Заболевания нижних дыхательных путей:

острый и хронический бронхит, пневмония, абсцесс легких, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, бронхолит, коклюш.

Профилактика и лечение:

бронхолегочных осложнений после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы

Ингаляционно:

взрослым – по 250 мг 1-2 раза в сутки; детям – по 125 мг 1-2 раза в сутки.

Внутримышечно:

взрослым – по 500 мг 2-3 раза в сутки;
детям:
до 3 лет – по 125 мг 2 раза в сутки;
от 3 до 7 лет – по 250 мг 2 раза в сутки;
от 7 до 12 лет – по 250 мг 3 раза в сутки;
от 13 до 15 лет – по 500 мг 2 раза в сутки;
от 16 до 18 лет – 500 мг 2 или 3 раза в сутки.

Местно:

закапывать по 2-4 капли в каждый носовой ход или наружный слуховой проход².
Курс лечения – не более 10 дней².

Преимущества

- Единственная комбинация антибиотика и муколитика для топического лечения респираторных инфекций³.
- Тиамфеникол – антибиотик с доказанной активностью в отношении основных возбудителей респираторных инфекций⁴.
- Разнообразие путей введения².
- Ингаляционный путь введения обеспечивает антибактериальное действие в очаге воспаления^{5,6}.
- Позволяет избежать побочных эффектов, свойственных системным антибиотикам⁷.

Входит в Клинические рекомендации

Острый синусит⁹
Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин¹⁰
Муковисцидоз¹⁸

Оригинальный N-ацетилцистеин. Формы выпуска



Информация для специалистов системы здравоохранения

ООО «Замбон Фарма». Россия, 119002, Москва, Глазовский пер., д. 7. Тел.: +7 (495) 933-38-30/32 | Факс: (495) 933-38-31

Zambon

RU-FLUI-RES-2300003

	ОТС
N-ацетилцистеин Туаминогептана сульфат	
Назальный спрей	
Интраназально	
Показания к применению	

Острый и подострый ринит с густым гнойно-слизистым секретом, хронический ринит, вазомоторный ринит, атрофический ринит, синусит²¹

Способ применения и дозы

Взрослым: по 2 дозы спрея в каждый носовой ход 3-4 раза в день.
Детям старше 6 лет: по 1 дозе спрея в каждый носовой ход 3-4 раза в день.
Длительность лечения не должна превышать 7 дней.

Преимущества

Показания к применению

Оригинальный топический муколитик с сосудосуживающим компонентом³. Мягко устраняет отек и гиперемию слизистой полости носа и ОНП без системных воздействий²². Восстанавливает нарушенную дренажную функцию слизистой носа и ОНП²² Обладает противовоспалительным действием. Препятствует адгезии бактериальной флоры к слизистым носа и ОНП, предотвращая тем самым развитие осложнений.

Способ применения и дозы

Входит в Клинические рекомендации

Острый синусит ⁸
Острый средний отит ²⁰

	ОТС
N-ацетилцистеин	
Шипучие таблетки для приема внутрь	
Для приема внутрь	
Показания к применению	

Для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, связанных с чрезмерным выделением бронхиального секрета: бронхит, трахеит, бронхолит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, абсцесс легких, эмфизема легких, ларинготрахеит, интерстициальные заболевания легких¹.

Способ применения и дозы

Взрослым: 1 таблетку шипучую 600 мг растворяют в 1/3 стакана воды и принимают один раз в день. При острых заболеваниях продолжительность курса лечения составляет от 5 до 10 дней; при лечении хронических заболеваний – до нескольких месяцев (по рекомендации врача).

Преимущества

Показания к применению

Оригинальный муколитик-антиоксидант с плейотропными свойствами¹:


- прямым муколитическим;
- противовоспалительным;
- антиоксидантным;
- препятствует адгезии бактериальной флоры к слизистым верхних и нижних дыхательных путей;
- разрушает бактериальные пленки;
- противовирусное действие.

Не содержит сахарозу и лактозу – может быть рекомендован к применению лицам с сахарным диабетом.

Входит в Клинические рекомендации

Острый синусит ⁹	COVID-19 ¹⁵
Острый бронхит у взрослых ¹³	Грипп у взрослых ¹⁶
Хронический бронхит ¹¹	Идиопатический легочный фиброз ¹⁷
ХОБЛ ¹²	Муковисцидоз ¹⁸
Внебольничная пневмония у взрослых ¹⁴	ОРВИ у взрослых ¹⁹
	Острый средний отит ²⁰

- Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил.
- Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил-антибиотик.
- Государственный реестр лекарственных средств, 2022.
- Иванчик Н. В., Сухорукова М. В., Чагарян А.Н. и др. In vitro активность тиамфеникола в отношении клинических изолятов Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2021. Том 23. № 1. С. 92-99.
- Зоненко О.Г., Черников В.В. Рациональный выбор антибактериальной и муколитической терапии у больных с респираторной инфекцией // Практика педиатра. 2017. № 5. С. 10-13.
- Vecellio L., Gerssem R. D., Guellec S. L. et al. Deposition of aerosols delivered by nasal route with jet and mesh nebulizers // Int J Pharmaceutics. 2011. Vol. 407. Issue 1-2. P. 87-94.
- Геппе Н.А., Колосова Н.Г., Дронов И.А. Опыт применения тиамфеникола глицинат ацетилцистеината при остром бронхите у детей // Пульмонология. 2017. Т. 27. № 4. С. 496-501.
- Клинические рекомендации: Острый синусит. Минздрав РФ, 2021.
- Игнатова Г. Л., Антонов В. Н. Место топической антибактериальной терапии при обострении хронического бронхита // Пульмонология. 2020. Т. 30. № 1. С. 79-84.
- Клинические рекомендации: Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин. Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Хронический бронхит. Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Хроническая обструктивнаая болезнь легких. Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Острый бронхит у взрослых. Минздрав РФ, 2022.
- Клинические рекомендации: Внебольничная пневмония у взрослых. Минздрав РФ, 2021.

	ОТС
N-ацетилцистеин	
Гранулы для приема внутрь	
Для приема внутрь	
Показания к применению	

Для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, связанных с чрезмерным выделением бронхиального секрета: бронхит, трахеит, бронхолит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, абсцесс легких, эмфизема легких, ларинготрахеит, интерстициальные заболевания легких¹.

Способ применения и дозы

Внутрь. Гранулы растворяют в 1/3 стакана воды.
Детям с 2 до 6 лет – по 200 мг 2 раза в день.
Детям старше 6 лет и взрослым – по 200 мг 2-3 раза в день.
При острых заболеваниях продолжительность лечения составляет от 5 до 10 дней; при лечении хронических заболеваний – до нескольких месяцев (по рекомендации врача).

Преимущества

Показания к применению

Оригинальный муколитик-антиоксидант с плейотропными свойствами¹:

- прямым муколитическим;
- противовоспалительным;
- антиоксидантным;
- препятствует адгезии бактериальной флоры к слизистым верхних и нижних дыхательных путей;
- разрушает бактериальные пленки;
- детоксикационное действие;
- противовирусное действие.

Не содержит сахарозу и лактозу – может быть рекомендован к применению лицам с сахарным диабетом.

Входит в Клинические рекомендации

Острый синусит ⁸	COVID-19 ¹⁵
Острый бронхит у взрослых ¹³	Грипп у взрослых ¹⁶
Хронический бронхит ¹¹	Идиопатический легочный фиброз ¹⁷
ХОБЛ ¹²	Муковисцидоз ¹⁸
Внебольничная пневмония у взрослых ¹⁴	ОРВИ у взрослых ¹⁹
	Острый средний отит ²⁰

- Временные методические рекомендации: COVID-19, версия 17. Минздрав РФ, 14.12.2022.
- Клинические рекомендации: Грипп у взрослых. Минздрав РФ, 2017.
- Клинические рекомендации: Идиопатический легочный фиброз. Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Кистозный фиброз (Муковисцидоз). Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых. Минздрав РФ, 2021.
- Клинические рекомендации: Отит средний острый. Минздрав РФ 2021.
- Инструкция по медицинскому применению препарата Ринофлуимуцил.
- Cogo A et al. Efficacy of topical tuaminoheptane combined with N-acetyl-cysteine in reducing nasal resistance. A double-blind rhinomanometric study versus xylometazoline and placebo. Arzneimittelforschung. 1996 Apr; 46(4):385-8