

## РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ у детей с 6 месяцев до 6 лет

на основании Национальной программы  
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия  
лечения и профилактика». 2021 г.<sup>1</sup>



### Базисная терапия БА<sup>1</sup>

Тяжесть БА	Разовая доза	Кратность приема	Длительность приема
Легкая	0,25 мг	1-2 раза в день	Не менее <b>2-3 мес.</b> При достижении контроля через 1-2 мес. возможно снижение дозы до 0,25 мг 1 раз в день
Средне-тяжелая и тяжелая	0,5 мг	1-2 раза в день	<b>4-6 мес.</b> при среднетяжелой БА, <b>6-8 мес. и более</b> при тяжелой БА. При достижении контроля через 1-3 месяца возможно снижение дозы до 0,5 мг 1 раз в день



### Терапия обострений БА<sup>1</sup>

Тяжесть обострений	Разовая доза	Кратность приема	Длительность приема
Легкое	0,5 мг	2 раза в день	5-7 дней, далее уменьшение дозы на 50% до разрешения симптомов
Средней тяжести	0,5 мг	2 раза в день	В первый день 2 ингаляции с интервалом 1 час. В последующие дни ингаляции через 6-8 ч. до разрешения симптомов
Тяжелое	1 мг	2 раза в день	До разрешения симптомов

В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена<sup>2</sup>

При обострении любой ст. тяжести – КДБА по потребности или в комбинации с ипратропия бромидом, при тяжелом обострении – при необходимости системные ГКС (дексаметазон, преднизолон)<sup>1</sup>

### Острый стенозирующий ларинготрахеит<sup>2,3</sup>

**2 мг в сутки 2-5 дней,**  
до полного исчезновения симптомов



