

Краткая информация по медицинскому применению препарата:

ЭРГОФЕРОН

Регистрационный номер

ЛП-Н (000031) - (PF-RU)

Торговое название

Эргоферон

Лекарственная форма

таблетки для рассасывания

Состав (на 1 таблетку)

Действующие вещества

антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,006 г*

антитела к гистамину аффинно очищенные – 0,006 г*

антитела к CD4 аффинно очищенные – 0,006 г*

Вспомогательные вещества

лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное и иммуностимулирующее средство.

Коды АТХ

L03AX

Показания к применению

Эргоферон показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 месяцев.

Лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Лечение острых кишечных инфекций вирусной этиологии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Детский возраст до 6 месяцев.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Безопасность применения препарата Эргоферон у беременных не изучалась.

При беременности и в период лактации препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Соотношение «польза-риск» определяется лечащим врачом.

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части.

Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку следует держать во рту, не проглатывая, до полного растворения.

При назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.

Взрослым и детям с 6 месяцев. В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.

Побочное действие

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Особые указания

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Эргоферон не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

* *наносятся на лактозы моногидрат в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведенной субстанции, разведенной соответственно в 100¹², 100³⁰, 100⁵⁰ раз.*

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 127473, Россия,
г. Москва, 3-й Самотечный пер. д.9 Тел./факс: 8 (495) 684 43 33
Телефон горячей линии +7 (495) 6819300

Информация для специалистов
здравоохранения

ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ И ГРИППА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



БРЕНД ГОДА В НОМИНАЦИИ «ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУДЫ И ГРИППА»
МАРКА №1 В РОССИИ В КАТЕГОРИИ «СРЕДСТВО ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА»**

- Широкий спектр противовирусного действия¹
- Облегчение симптомов уже ко 2-3 дню лечения^{2,3}
- Укрепление системного и местного иммунитета дыхательных путей^{1,4}
- Профилактика бактериальных осложнений вирусных инфекций^{2,3,5}



1. На основании инструкции по медицинскому применению препарата Эргоферон.

2. Никифоров В.В., Руженцова Т.А. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2019, Т. 8, № 4. С. 84-97.

3. Гепле и соавт. Терапия. 2017; 8(18):63-78.

4. Крамарьев С.О., Загордонцев Л.В.

Современная педиатрия. 2014; 8(64):1-4.

5. Селькова Е.П. и соавт. Пульмонология. 2019;29(3):302-310.

* Бренд Эргоферон по итогам 2019 г. является победителем фармацевтической премии «Зеленый крест» в категории «Бренд Года», номинация «Препарат выбора для лечения простуды и гриппа»

** По результатам общенационального голосования МАРКА №1 В РОССИИ 2019, марка «Эргоферон» является победителем ежегодного голосования в категории «Средство от простуды и гриппа».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЭРГОФЕРОН ПОДТВЕРЖДЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Статистический анализ 6 РКИ с использованием объединенных оценок средних значений и стандартных отклонений²

4 РКИ с двойным слепым плацебо-контролем (Эргоферон/Плацебо)

2 открытых сравнительных РКИ (Эргоферон/осельтамивир)

1441

Суммарное число пациентов во всех 6 исследованиях
Возраст – от 6 мес до 70 лет



848

взрослые



593

дети

715

ЭРГОФЕРОН

554

ПЛАЦЕБО

результат



Средняя длительность лихорадки ($\leq 37,2^{\circ}\text{C}$)

2,61 ± 1,54
дня



Тяжесть симптомов по площади под кривой (AUC_{тс})

на **4** балла меньше



Доля пациентов с ухудшением течения заболевания

0,7%
всего

Достоверно различается с плацебо

Эргоферон обладает благоприятным профилем безопасности

Международная наблюдательная программа «Эрмитаж»³



519

Врачей общей практики
8 стран



2 069

Пациентов (от 18 до 90 лет)



6 005

Детей (от 6 мес до 18 лет)

Пациенты с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, независимо от сроков начала заболевания

результат



Устранение симптомов ОРВИ

2 – 3
дня



Дополнительная антибактериальная терапия*

3,3%
пациентов



Использование в монотерапии

49%
пациентов

98,9% Врачей оценили терапию Эргофероном как ЭФФЕКТИВНУЮ

ЭРГОФЕРОН – это обоснованный выбор для медикаментозной терапии орви, включая грипп, обеспечивающий ее высокую эффективность и безопасность у взрослых и детей с 6 месяцев

*на второй и последующий дни лечения Эргофероном.