

# ИБУКЛИН ЮНИОР®

## **Показания к применению:**

- Лихорадочный синдром.
- В качестве вспомогательного лекарственного средства для лечения болевого и лихорадочного синдрома при синусите, тонзиллите, острых инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей (фарингит, трахеит, ларингит).
- Болевой синдром слабой или умеренной интенсивности различной этиологии: зубная боль, боль при растяжении связок, вывихах, переломах.

## **Способ применения и режим дозирования:**

Дети старше 3-х лет.

Таблетку Ибуклин Юниор® следует растворить в 5 мл (1 чайная ложка) воды.

Суточная доза препарата принимается в 2-3 приема. Минимальный интервал времени между приемом препарата – 4 часа.

Разовая доза – 1 таблетка.

Суточная доза зависит от возраста и веса ребенка: 3-6 лет (13-20 кг) 3 таблетки в сутки;

6-12 лет (20-40 кг) до 6 таблеток в сутки.

# ИБУКЛИН ЮНИОР®

**ДВОЙНАЯ СИЛА**  
**ПРОТИВ ЖАРА И БОЛИ!**

Ибупрофен

**100** МГ

Парацетамол

**125** МГ



**3+**



Жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие



Диспергируемые таблетки для детей от 3-х лет (от 13 кг)



Фиксированная комбинация парацетамола и ибупрофена



Эффективность комбинации выше, чем компонентов по отдельности\*

\* Инструкция по медицинскому применению.

# Дозовая карта ответственного назначения

## РАЗОВЫЙ ПРИЕМ<sup>1</sup>

ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ суспензия 120 мг парацетамола в 5 мл суспензии				ИБУКЛИН ЮНИОР диспергируемые таблетки 125 мг парацетамола + 100 мг ибупрофена				НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ суспензия 20 мг ибупрофена в 1 мл суспензии		
До 4-х раз в день				Детям 3-6 лет (13-20 кг) до 3-х раз в день Детям 6-12 лет (20-40 кг) до 6-ти раз в день				Детям 6-12 мес 3-4 раза в день Детям 1-12 лет до 3-х раз в день		
Возраст	Масса тела	Объему суспензии	Дозировка парацетамола	Возраст	Масса тела	Дозировка парацетамола	Дозировка ибупрофена	Возраст	Объему суспензии	Дозировка ибупрофена
2-3 мес	4,5-6 кг	2,8-3,75 мл	68-90 мг					6-12 мес	2,5 мл	50 мг
3-6 мес	6-8 кг	4 мл	96 мг							
6-12 мес	8-10 кг	5 мл	120 мг							
1-2 года	10-13 кг	7 мл	168 мг							
2-3 года	13-15 кг	9 мл	216 мг							
3-6 лет	15-21 кг	10 мл	240 мг	3-6 лет	12-20 кг	125 мг	100 мг	4-6 лет	7,5 мл	150 мг
6-9 лет	21-29 кг	14 мл	336 мг	6-12 лет	20-40 кг	от 125 мг	100 мг	7-9 лет	10 мл	200 мг
9-12 лет	29-42 кг	20 мл	480 мг			до 250 мг	до 200 мг	10-12 лет	15 мл	300 мг

**Эффективность комбинации выше, чем компонентов по отдельности**

<sup>1</sup> www.GRLS.ru Инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов Панадол детский суспензия, Ибуклин Юниор диспергируемые таблетки, Нурофен для детей суспензия.

# Дозовая карта ответственного назначения

## СУТОЧНЫЙ ПРИЕМ<sup>1</sup>

ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ суспензия 120 мг парацетамола в 5 мл суспензии				ИБУКЛИН ЮНИОР диспергируемые таблетки 125 мг парацетамола + 100 мг ибупрофена				НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ суспензия 20 мг ибупрофена в 1 мл суспензии		
До 4-х раз в день				Детям 3-6 лет (13-20 кг) до 3-х раз в день Детям 6-12 лет (20-40 кг) до 6-ти раз в день				Детям 6-12 мес 3-4 раза в день Детям 1-12 лет до 3-х раз в день		
Возраст	Масса тела	Объему суспензии	Дозировка парацетамола	Возраст	Масса тела	Дозировка парацетамола	Дозировка ибупрофена	Возраст	Объему суспензии	Дозировка ибупрофена
2-3 мес	4,5-6 кг	11,2-15 мл	44-360 мг					6-12 мес	10 мл	200 мг
3-6 мес	6-8 кг	16 мл	384 мг							
6-12 мес	8-10 кг	20 мл	480 мг							
1-2 года	10-13 кг	28 мл	672 мг							
2-3 года	13-15 кг	36 мл	864 мг							
3-6 лет	15-21 кг	40 мл	960 мг	3-6 лет	12-20 кг	375 мг	300 мг	4-6 лет	22,5 мл	450 мг
6-9 лет	21-29 кг	56 мл	1 344 мг	6-12 лет	20-40 кг	750 мг	600 мг	7-9 лет	30 мл	600 мг
9-12 лет	29-42 кг	80 мл	1 920 мг					10-12 лет	45 мл	900 мг

Ибуклин Юниор® как комплексный препарат, обеспечивающий полноту фармакологического эффекта, связанного с одномоментным приемом отличающихся по механизму действия, но взаимодополняющих друг друга активных веществ в оптимальном соотношении доз, и может рассматриваться как препарат первой линии для симптоматической и патогенетической терапии лихорадки и болевого синдрома различного генеза в детской амбулаторно-поликлинической практике.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Т.В. Сологуб, И.И. Токин, В.В. Цветков, Л.М. Цыбалова, Грипп в практике клинициста, эпидемиолога и вирусолога // 000 «Медицинское информационное агентство», 2017, стр. 181