

ПРИМЕНЕНИЕ ОМ-85 В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОРВИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ



ОМ-85 – препарат **первого выбора** при необходимости иммунной коррекции в большинстве клинических случаев, т.к. имеет самую большую и убедительную доказательную базу



ОМ-85 – системно действующий препарат, усиливающий мукозальный **иммунный ответ** на **вирусную** и **бактериальную** инфекцию в респираторном тракте посредством повышения эффективности механизмов врожденного и адаптивного иммунитета



ОМ-85 – имеет **высокий профиль безопасности**, и может применяться в том числе и у детей с аллергопатологией, включая бронхиальную астму*

*по зарегистрированным показаниям



ОМ-85 – используется у детей с недостаточностью противоинфекционной защиты **с любого дня заболевания** в комплексном лечении ОРВИ с целью:



снижения тяжести и **длительности** заболевания,




а также **риска** бактериальных **осложнений**



ОМ-85 – действующее вещество препарата **Бронхо-Мунал®**, содержит лиофилизат компонентов 21 штамма 8 различных видов бактерий

Клинические ситуации, когда прием бактериальных лизатов целесообразен, представлены в таблице 1:

КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ		ЦЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ	
Острая респираторная инфекция (комплексное лечение)	В начале заболевания	Уменьшение клинических проявлений воспалительного процесса Ускорение выздоровления	Предотвращение развития бактериальных осложнений Снижение потребности в антибиотикотерапии
	При прогрессировании заболевания (вместе с антибиотиками)	Ускорение выздоровления Снижение риска сохранения в организме антибиотико-резистентных штаммов бактерий	Повышение эффективности антибактериальной терапии Профилактика хронического воспаления Уменьшение клинических проявлений заболевания, ограничение дальнейшей генерализации инфекции
Реабилитация		Ускорение репаративных процессов	Профилактика рецидивов и хронизации заболевания
Профилактика		Стойкая защита слизистой оболочки дыхательных путей от патогенов	Предотвращение повторных острых респираторных инфекций и их прогрессирования, обострений и прогрессирования хронических респираторных заболеваний



ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Бронхо-Мунал® П.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: лизаты бактерий.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N011633/01.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА – капсулы 3,5 мг.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Бронхо-Мунал® П применяется у детей от 6 месяцев до 12 лет: в составе комплексной терапии острых инфекций дыхательных путей; для профилактики рецидивирующих инфекций дыхательных путей и обострений хронического бронхита.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст младше 6 месяцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: препарат принимают по 1 капсуле в день утром, натощак, за 30 минут до еды. Детям до 3-х лет или в случае, если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть, содержимое смешать с небольшим количеством жидкости (чай, молоко или сок). Для профилактики рецидивирующих инфекций дыхательных путей и обострений хронического бронхита препарат применяют тремя курсами по 10 дней, интервал между курсами 20 дней. В составе комплексной терапии острых инфекций дыхательных путей препарат применяют до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При проведении антибиотикотерапии Бронхо-Мунал® П следует принимать в сочетании с антибиотиками с начала лечения. Последующие 2 месяца возможно профилактическое применение препарата: курсами по 10 дней, интервал между курсами 20 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Бронхо-Мунал® П обычно хорошо переносится. Большинство побочных реакций отнесены к общей категории со средней или умеренно-тяжелой степенью проявления. Наиболее частыми проявлениями побочного действия являются расстройство желудочно-кишечного тракта, кожные реакции и нарушения со стороны органов дыхания: диарея, боль в животе; кашель; сыпь.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: во избежание передозировки детям от 6 месяцев до 12 лет не следует применять Бронхо-Мунал® капсулы 7 мг, предназначенный для взрослых. В случае сохраняющихся желудочно-кишечных расстройств, кожных реакций, нарушений со стороны органов дыхания или других симптомов непереносимости препарата, необходимо отменить препарат и обратиться к врачу.