

# ИНФЕКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ



# РИНОФЛУИМУЦИЛ®

Ацетилцистеин, туаминогептана сульфат

## ЕДИНСТВЕННЫЙ\* ТОПИЧЕСКИЙ МУКОЛИТИК С СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ<sup>1</sup>

РАСТВОРЯЕТ И ВЫВОДИТ СЛИЗЬ  
ИЗ ПОЛОСТИ НОСА И ПАЗУХ<sup>2</sup>

СНИМАЕТ ОТЕК СЛИЗИСТОЙ  
ПОЛОСТИ НОСА<sup>2</sup>

ПРЕПАРАТ ВЫБОРА НА ВСЕХ  
СТАДИЯХ ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНОСИТОВ  
ЛЮБОЙ ЭТИОЛОГИИ<sup>4</sup>

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>2</sup>

- Острый и подострый ринит с густым слизисто-гнойным секретом
- Хронический ринит
- Вазомоторный ринит
- Синусит

ФОРМА ВЫПУСКА:  
НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ,  
10 МЛ

**Взрослым** по 2 дозы спрея  
в каждый носовой ход 3-4 раза в день<sup>2</sup>

**Детям с 3-х лет**  
по 1 дозе спрея в каждый  
носовой ход 3-4 раза в день<sup>2</sup>



# ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ И ИНЪЕКЦИЙ

## МУКОЛИТИК И АНТИБИОТИК

- ➔ ПРЯМОЕ МУКОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ➔ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

### ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- синусит
- экссудативный средний отит
- ларинготрахеит
- острый и хронический бронхит
- затяжная пневмония
- муковисцидоз
- бронхоэктатическая болезнь

В небулайзере  
с распределительным  
клапаном  
(компрессионном)

**Взрослым** – по 250 мг

**Детям** – по 125 мг  
1-2 раза в сутки

# ФЛУИМУЦИЛ® – АНТИБИОТИК ИТ

Н-ацетилцистеин + тиамфеникол<sup>18</sup>

**ФОРМА ВЫПУСКА:  
ЛИОФИЛИЗАТ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
РАСТВОРА ДЛЯ  
ИНЪЕКЦИЙ И ИНГАЛЯЦИЙ**



РУП N012977/01 от 10.06.2008

# ФЛУИМУЦИЛ®

100 МГ/МЛ №5

N-ацетилцистеин

**ФОРМА ВЫПУСКА:  
РАСТВОР  
для ИНЪЕКЦИЙ  
и ИНГАЛЯЦИЙ**

- Обладает прямым муколитическим действием<sup>7</sup>
- Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях<sup>7</sup>
- Активен в отношении всех типов бронхиального секрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)<sup>8</sup>
- Оказывает антиоксидантное, цитопротекторное и фибринолитическое действие

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

### Острые заболевания:

острый бронхит, трахеит, ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь

### Хронические болезни:

хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких, ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой), средний отит, острый и хронический синусит



### Ингаляции

В ультразвуковых небулайзерах –

1 ампула 1-2 раза в сутки

В небулайзере с распределительным клапаном (компрессионном) –

1 ампула 1-2 раза в день

### Инъекции

В/в или в/м, разбавив 0,9% раствором NaCl, капельно или медленно струйно в течение 5 минут

Детям от 6 до 14 лет ½ ампулы

1-2 раза в сутки

Взрослым по 1 ампуле 1-2 раза в сутки

- ➔ Обладает прямым муколитическим действием<sup>10</sup>
- ➔ Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях<sup>10</sup>
- ➔ Активен в отношении всех типов бронхиального секрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)<sup>10</sup>
- ➔ Оказывает антиоксидантное и цитопротекторное действие<sup>10</sup>
- ➔ Не содержит сахара<sup>10</sup>

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>8</sup>

**Пациенты с затруднением отхождения мокроты:**

**острые заболевания** – трахеобронхит, бронхит, пневмония

**хронические болезни** – хронический бронхит, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма

острый и хронический риносинусит, отит

**Взрослым** 1 таблетку в день, растворив в 1/3 стакана воды

**При острых заболеваниях** продолжительность курса 5-10 дней

**При хронических заболеваниях** – по рекомендации врача<sup>10</sup>

# ФЛУИМУЦИЛ®

600 МГ №10 и №20

N-ацетилцистеин

**ФОРМА ВЫПУСКА:  
ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ  
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ**



# ФЛУИМУЦИЛ®

200 МГ №20

N-ацетилцистеин

ФОРМА ВЫПУСКА:  
ГРАНУЛЫ ДЛЯ ПРИЕМА  
ВНУТРЬ

ГРАНУЛЫ  
1 ПАКЕТИКА  
РАСТВОРИТЬ  
В 1/3 СТАКАНА  
ВОДЫ



РУ П Н 012975/02 от 14.09.2007

- Обладает прямым муколитическим действием<sup>11</sup>
- Уменьшает воспаление в легочной ткани и дыхательных путях<sup>11</sup>
- Активен в отношении всех типов бронхиального секрета (слизистого, слизисто-гнойного и гнойного)<sup>11</sup>
- Оказывает антиоксидантное и цитопротекторное действие<sup>11</sup>
- Не содержит сахара<sup>11</sup>

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>8</sup>

**Пациенты с затруднением отхождения мокроты:**

**острые заболевания** – трахеобронхит, бронхит, пневмония

**хронические болезни** – хронический бронхит, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма

острый и хронический риносинусит, отит

**Детям от 2 до 6 лет** – по 200 мг 2 раза в день

**Детям старше 6 лет и взрослым** по 200 мг 2-3 раза в день

**При острых заболеваниях** продолжительность курса 5-10 дней

**При хронических заболеваниях** – по рекомендации врача<sup>11</sup>

# КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТОВ<sup>15</sup>

- ») С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
- ») ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ
- ») ПРОТИВОЗУДНЫМ  
ДЕЙСТВИЕМ



## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>15</sup>

- Острый и хронический наружный отит
- Средний острый отит на стадии до перфорации
- Хронический экссудативный средний отит

**Взрослым** по 4-5 капель 2-4 раза/сут.

**Детям** по 2-3 капли 3-4 раза/сут.  
в зависимости от тяжести заболевания

**КУРС ЛЕЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН  
ПРЕВЫШАТЬ 7 ДНЕЙ**

РУ П N012942/01 от 14.09.2007



# АНАУРАН<sup>®</sup>

# АНАУРЕТТЕ®

ФИТОСКВАЛАН | МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО | МЯТНОЕ МАСЛО

## СПРЕЙ

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРНЫХ ПРОБОК<sup>13</sup>

### Фитосквалан

(Phytosqualan®) — экстракт  
оливкового масла, растворяет  
ушную серу

### Минеральное масло

смывает растворённую серу

### Мятное масло

нагревает наружный слуховой  
проход, ускоряет процесс растворения,  
обеспечивает приятный запах спрея



РНДЗ/01/06 от 07.08.2013

### ФАКТОРЫ РИСКА ОБРАЗОВАНИЯ СЕРНЫХ ПРОБОК<sup>14</sup>

- слуховые аппараты
- телефонные гарнитуры
- пребывание в запыленных местах или зонах повышенной влажности
- занятие водными видами спорта и отдыха

Для взрослых  
и детей старше 3 месяцев

**Назаваль®** используется для профилактики и в комплексной терапии аллергического ринита<sup>16</sup>

**Назаваль®** действует как естественный барьер по отношению к аэроаллергенам, препятствуя развитию аллергии<sup>16</sup>

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>16</sup>

Применяется при аллергическом рините для защиты слизистой носа от аэроаллергенов и поллютантов, а также других агрессивных факторов внешней среды, вдыхаемых с воздухом.

### Взрослые и дети

#### 1. Профилактика АР:

при аллергии на пыльцу растений (сезонная аллергия) – начать использовать Назаваль® заблаговременно, за 1–2 недели до предполагаемого начала сезона пыления. При круглогодичном рините (аллергии на домашнюю пыль, животных и др.) можно использовать ситуационно за 5–10 минут до предполагаемого контакта с аллергеном.

#### 2. Комплексная терапия АР:

по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов).

**Назаваль®** может применяться у детей и взрослых, а также у женщин в период беременности и кормления грудью.

**ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗАВАЛЬ® МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТАК ЧАСТО, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО.**

# Назаваль

Микронизированная целлюлоза  
растительного происхождения

**ФОРМА ВЫПУСКА:  
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ  
ДОЗИРОВАННЫЙ,  
500 МГ**



# Назаваль ПЛЮС

Микронизированная целлюлоза  
растительного происхождения,  
экстракт дикого чеснока

ФОРМА ВЫПУСКА:  
СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ  
ДОЗИРОВАННЫЙ,  
500 МГ

## Назаваль® ПЛЮС

- действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для защиты от проникновения вирусов и бактерий, попадающих в верхние дыхательные пути при вдыхании воздуха<sup>17</sup>
- является профилактическим средством от ОРВИ (в том числе гриппа) и других простудных заболеваний<sup>17</sup>



ЭКСТРАКТ ДИКОГО ЧЕСНОКА  
ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БАКТЕРИЙ  
И ВИРУСОВ, ПОПАДАЮЩИХ  
НА СЛИЗИСТУЮ НОСА  
С ВДЫХАЕМЫМ ВОЗДУХОМ,  
И НЕЙТРАЛИЗУЕТ ИХ.

### КАК ПРИМЕНЯТЬ

1. Однократно (перед посещением многолюдных мест).
2. Ежедневно – для защиты в период эпидемии.

## НЕВИДИМАЯ МАСКА. ЗАЩИЩАЕТ СЛИЗИСТУЮ НОСА

Назаваль® ПЛЮС  
может применяться  
у детей и взрослых,  
а также у женщин  
в период беременности  
и кормления грудью.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗАВАЛЬ®  
ПЛЮС МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН  
ТАК ЧАСТО, КАК ЭТО НЕОБХОДИМО.



# Монурал®

фосфомицин

**ФОРМА ВЫПУСКА:  
ГРАНУЛЫ ДЛЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
РАСТВОРА ДЛЯ  
ПРИЕМА ВНУТРЬ**  
3 г №1, 3 г №2, 2 г №1



РУ - П № 012976/01

## Первая линия терапии инфекций нижних мочевых путей

УРОВЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 1A<sup>19</sup>

- Самый высокий уровень чувствительности возбудителей ИМП<sup>20</sup>
- Клиническая эффективность и безопасность препарата доказаны за **более чем 40 лет применения в разных странах мира**<sup>20</sup>
- Курс лечения, состоящий из одной дозы препарата, обеспечивает 100% комплаентность<sup>20</sup>
- Не имеет клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами<sup>20</sup>

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- острый бактериальный цистит, острые приступы рецидивирующего бактериального цистита
- бактериальный неспецифический уретрит
- бессимптомная массивная бактериурия у беременных
- послеоперационные инфекции мочевыводящих путей

### Внутрь.

**Острый цистит:** 3 г однократно  
**Рецидивирующий цистит:** 2 раза по 3 г с интервалом 24 часа

**С целью профилактики** инфицирования мочевыводящих путей при хирургическом вмешательстве, трансуретральном диагностическом процедурах Монурал® принимают 2 раза по 3 г: за 3 часа до вмешательства и через 24 часа после вмешательства.

### Способ применения

Гранулы растворяют в 1/2 стакана воды (50-75 мл) или другого напитка, перемешивают до полного растворения. Принимают сразу же после растворения.

## Ссылки

\* Ринофлуимуцил — единственный назальный спрей имеющий в своем составе ацетилцистеин по данным государственного регистра лекарственных средств, 01.2021.

1. Государственный регистр лекарственных средств, 01.2021.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Ринофлуимуцил.
3. Cogo A. et al. Efficacy of topical tuaminoheptane combined with N-acetylcysteine in reducing nasal resistance. A double-blind rhinomanometric study versus xylometazoline and placebo. *Arzneimittelforschung*. 1996 Apr; 46 (4):385-8.
4. Клинические рекомендации: острый синусит. Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, 2016.
5. Brocard H, Charpin J, Germouty J. Multicenter, double-blind study of oral acetylcysteine vs. placebo. *Eur J Respir Dis Suppl*. 1980; 111:65-9.
6. Справочник поликлинического врача, 2008, №6, с 23-24.
7. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил.
8. Княжеская и соавт. N-ацетилцистеин (Флуимуцил) в терапии острых и хронических заболеваний органов дыхания. Справочник поликлинического врача. 2012. - N 4.- С. 56-60.

9. Дронов И.А. Новая форма N-ацетилцистеина для педиатрической практики: взгляд клинического фармаколога. *Consilium Medicum. Педиатрия*. (Прил.) 2013; 01: 76-7.

10. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 600 мг.
11. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 200 мг.
12. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил 20 мг/мл.
13. Инструкция по применению медицинского изделия Анауретте.
14. Свиштушкин В.М. Мустафаев Д.М. Современные возможности лечения и профилактики заболеваний наружного уха. *РМЖ*, 2013, т. 21, N11, стр. 560-63.
15. Инструкция по медицинскому применению препарата Анауран.
16. Инструкция по применению медицинского изделия Назаваль.
17. Инструкция по применению медицинского изделия Назаваль Плюс.
18. Инструкция по медицинскому применению препарата Флуимуцил-антибиотик.
19. Цистит. Клинические рекомендации. МЗРФ.
20. Zhanel G.G. et al.; *Can J Infect Dis Med Microbiol* 2016; 2016: 2082693
21. ИНСТРУКЦИЯ (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Монурал.

## ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ООО «Замбон Фарма»  
Россия, 121002, Москва,  
Глазовский пер., д. 7  
Тел.: (495) 933-38-30/32

**Zambon**

ZAM2103100909