

# Ингавирин®




Противовирусный препарат нового поколения для лечения и профилактики гриппа А и В и других ОРВИ<sup>1</sup>

↓ Снижает риск развития осложнений в 8,7 раза<sup>2</sup>

- СИРОП 30мг/5мл для детей с 3 лет
- КАПСУЛЫ 60 мг для детей с 7 лет



## Схема приема

 Для детей от 3 до 6 лет	Ингавирин® сироп 30 мг/5 мл ➤ 30 мг (5мл) 1 раз в день ➤ в течение 5 дней
 Для детей с 7 лет	Ингавирин® сироп 30 мг/5 мл или капсулы 60 мг ➤ 60 мг (10 мл) 1 раз в день ➤ в течение 5-7 дней
	При выраженных симптомах, а также при наличии сопутствующих заболеваний следует принимать двойную дозу препаратов первые три дня заболевания, далее продолжить приём в обычной дозировке в течение 2-4 дней

# Граммидин®

Препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта

МНН: Грамицидин С + Цетилпиридиния хлорид




Воздействует на весь спектр возбудителей заболевания: вирусы, грамм+ и грамм- бактерии (в т. ч. в форме биопленок), грибы; уменьшает воспаление и смягчает неприятные ощущения в горле



Обладает приятным малиновым вкусом



## Схема приема

Граммидин детский спрей <sup>3</sup>	
 Для детей от 3 до 5 лет	➤ по 2 впрыска 3 раза в день ➤ в течение 7 дней
 Для детей с 6 лет	➤ по 4 впрыска 3 раза в день ➤ в течение 7 дней
Граммидин детский таблетки <sup>4</sup>	
 Для детей от 4 до 12 лет	➤ по 1 таблетке 4 раза в день
 Для детей старше 12 лет	➤ по 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут) 4 раза в день

# Нормомед®

Противовирусный препарат с иммуномодулирующей активностью

МНН: Инозин Пранобекс


Благодаря двойному действию не только борется с вирусами, но и нормализует иммунитет, а значит способствует повышению устойчивости к вирусным заболеваниям



Сироп удобно дозировать: 1 мл на 1 кг массы тела



## Схема приема

<b>Острые заболевания</b> <sup>5,6</sup>	➤ 50 мг/1 кг в 3-4 приема ➤ 5-14 дней
<b>Герпетические инфекции</b> <sup>5,6</sup>	➤ 50 мг/1 кг в 3-4 приема ➤ 5-10 дней
<b>Хронические рецидивирующие заболевания</b> <sup>6</sup>	➤ 50 мг/1 кг в 3-4 приема ➤ Несколько курсов по 5-10 дней с интервалами 8 дней
	Препарат применяется у детей с 3 лет и с массой тела более 15-20 кг

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Ингавирин®, ЛП-002968, ЛП-006482. 2. Геппе Н.А., Теплякова Е.Д., Шульдяков А.А. и соавт. Инновации в педиатрии: оптимальный клинический эффект при лечении ОРВИ у детей препаратом комплексного действия. Педиатрия, 2016, Том 95 №2, стр. 96 – 103. 3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Граммидин®, ЛП-002179. 4. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Нормомед® ЛП-004000. 5. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Нормомед® ЛП-004700